


CUIDADOS DESPUÉS DE LA CIRUGÍA DE PALADAR


Felicitaciones! Gracias a su empeño y colaboración, su niño(a) ha llegado a esta importante fase en el proceso de rehabilitación. Su compromiso consiste en facilitarle una adecuada recuperación y hacer lo más adecuado para que regrese a FISULAB muy pronto. Estas son las principales recomendaciones que nos permitirán alcanzar esta meta común.



No alimente al niño(a) hasta que el médico o enfermera le den su aprobación. Es probable que el niño(a) sienta sed. Sin embargo no le brinde nada de beber sin autorización médica.



No alimente al bebé con tetero, pitillo o chupo; y dado que el niño ha llegado a una edad en la que es capaz de tomar en un vaso corriente o de pico o con cuchara y ya no necesita el tetero, aproveche para eliminarlo por siempre. Esto favorece el desarrollo del lenguaje, crecimiento emocional y salud oral.



Es importante que siga estrictamente las indicaciones del médico en cuanto a la dieta. Inicialmente debe ser totalmente líquida y de acuerdo a la evolución de los puntos el médico le autorizará introducir alimentos blandos, semiduros y gradualmente hasta llegar a la alimentación habitual.



Es usual que los labios del niño(a) se resequen en exceso después de la operación. La aplicación diaria de vaselina en los labios, con un copito de algodón, resuelve este inconveniente.



Mantenga las manos del niño(a) lejos de la boca, él sentirá ganas de meterse los dedos o juguetes y rascarse el paladar, evítelo a toda costa. El uso de inmovilizadores para brazos cuando no esté pendiente del niño(a) (mientras duerme, por ejemplo) será de gran ayuda.



Con el fin de mantener libre la nariz del niño(a), aplique una o dos gotas de suero fisiológico por cada una de las fosas nasales. Hágalo tres veces al día.



Los puntos del paladar se caen solos, es importante mantener una buena higiene en el paladar, así es que lave con agua hervida y una jeringa después de comer para evitar que queden residuos de alimento en los puntos y genere infecciones.